



DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ORTODONCIA PROPUESTO POR LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORTODONCIA.

En cumplimiento de la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, se le presenta para su firma el siguiente documento.

documento.	
D/Dª Andreza Gonzelet Riberro con	DNI como
paciente (en caso de menores o incapacitados consignar el nombre	v DNI del padre, madre o
tutor	sido informado/a nor el
Dr./Dra	3600 1766
fecha 5 de novembre 2027 sobre los procedi	mientos clínicos de ortodoncia,
que constan en el plan de tratamiento que previamente he aceptado. Lo	s procedimientos propios de la
ortodoncia van dirigidos al tratamiento de anomalías en la colocación dent	
pueden producir alteraciones en la función masticatoria y en la estétic	a, principalmente. El propósito
principal de la ortodoncia es mejorar la salud bucal al conseguir un alineam	
como una relación intermaxilar adecuada con una oclusión normal. Los trata	
pueden formar parte de tratamientos más complejos y asociarse a tratamie	ntos periodontales o de prótesis
dental. En ocasiones la ortodoncia se realiza como preparación de las arcad	as para tratamientos de cirugía
ortognática (que realizará bajo su responsabilidad el cirujano máxilofacial)	. La ortodoncia incluye muchos
posibles procedimientos. Éstos se podrían clasificar, de forma muy básica, en	procedimientos de aparatología
fija (vestibular o lingual), aparatología removible, aparatos ortopédicos bu	cofaciales, y todas sus posibles
combinaciones. Todos los aparatos pero en especial los removibles requieres	n una adecuada colaboración en
su uso y cuidados para obtener el resultado previsto. Si el paciente no lo usa	el tiempo prescrito, el resultado
y la duración no serán los previstos.	
Este procedimiento está indicado para el problema que tiene	
production of the marcado para of problema que tiene	el/ la paciente, consistente
en ageneria de 15/35 e incisivo infero	1.1.1.1.du.do

en palatino

Se han sopesado y descartado por distintos motivos de los que ha sido informado/a otros procedimientos terapéuticos alternativos como.....

El/la paciente ha sido informado/a y conoce los riesgos que puede comportar este tratamiento:

- Riesgo de sensibilidad dentaria debido a las fuerzas ejercidas sobre los dientes o maxilares.
- Riesgo de que se suelten partes de la aparatología fija (brackets, bandas, arcos, etc.) debido a las fuerzas masticatorias. Ante esta situación hay que consultar con el profesional.
- Riesgo de ingestión, o incluso aspiración, de los materiales empleados en ortodoncia fija (brackets, etc.) que se hubiesen podido despegar completamente.
- Riesgo de pequeñas molestias dolorosas de los dientes y la irritación de encías, labios, mejillas y lengua (llagas). Estas molestias suelen ser iniciales y remiten espontáneamente en unos días.

- Riesgo de alergia a los materiales empleados que podría provocar su retirada y un eventual cambio en el plan de tratamiento.
- Riesgo de que una deficiente higiene facilite la aparición de manchas blancas permanentes (descalcificaciones), caries dental o gingivitis (encías inflamadas). Se me ha explicado con toda claridad que durante el tratamiento debo de extremar las medidas higiénicas y evitar la ingesta frecuente de productos muy azucarados.
- En caso de tratamientos ortodóncicos con finalidad principalmente estética existirá siempre el riesgo de no cumplir con las expectativas del paciente por motivos difícilmente evitables: imprevisibilidad del crecimiento bucofacial, etc.
- Riesgo de que el desarrollo imprevisible de la erupción dentaria, el crecimiento de los maxilares o de respuesta de dientes o hueso a las fuerzas ortodóncicas obliguen a cambiar el plan de tratamiento, requiriendo en ocasiones extracciones de dientes definitivos para conseguir espacio y el alargamiento del tiempo de tratamiento.
- Algunos pacientes son más susceptibles a que se produzca la reabsorción (acortamiento) de la raíz de uno o varios dientes sometidos a fuerzas ortodóncicas. Este fenómeno es infrecuente, de etiología desconocida pero imprevisible. Habitualmente esto no tiene consecuencias apreciables, pero en ocasiones puede afectar a la longevidad del diente e implicaría alterar el plan de tratamiento.
- Riesgo de molestias o dolor en la articulación témporo-mandibular debido a la modificación del patrón oclusal necesario para el correcto alineamiento dental. Estos problemas pueden ocurrir con o sin tratamiento de ortodoncia y en general son debidos a factores previos predisponentes (hiperlaxitud ligamentosa, traumatismos previos, artrosis, artritis, bruxismo, stress etc.) y también a un fenómeno de maduración esquelética.
- Riesgo de retracciones de la encía, no previsibles, debidas al efecto de los movimientos dentarios. También pueden aparecer hipertrofiadas como consecuencia del acumulo de placa bacteriana.
- Los dientes incluidos tienen un tratamiento más complejo y sus resultados no se pueden asegurar. Existe la posibilidad que el diente incluido dañe la raíz de los dientes vecinos hasta en ocasiones, provocar su pérdida. En ocasiones el tratamiento falla por anquilosis dental que es imposible diagnosticar previo al tratamiento y que conllevaría la necesidad de extraerlo y reponerlo y estas actuaciones corresponderían a su dentista.
- Riesgo de que se produzcan modificaciones en los resultados conseguidos a la conclusión del tratamiento por factores de desarrollo o erupción dentaria, o por modificaciones en el hueso de soporte dental. Estos factores son difícilmente predecibles pero pueden ser paliados siguiendo las indicaciones dadas por el profesional respecto a la utilización de retenedores y a las revisiones una vez terminado el tratamiento.

		Sr./Srapor		
personales	() puede	e presentar
		consistentes en: El paciente ha sido informado de la in		
		nte el tratamiento de ortodoncia. Un deficiente control de l		
incluso a la	susp	ensión del tratamiento.		

El paciente también ha sido informado de que los tratamientos de ortodoncia, debido a los factores propios del desarrollo óseo y la erupción dentaria, pueden alargarse más tiempo del esperado. Asimismo los resultados conseguidos al final del tratamiento se pueden ver alterados por estos mismos factores.

La ortodoncia no es una ciencia exacta y, por ello ningún ortodoncista puede certificar el éxito ni garantizar un resultado específico.

Es relativamente frecuente que durante el curso del tratamiento se produzcan despegamientos o roturas de la aparatología utilizada que requerirán consultar con el ortodoncista.

Para prevenir todas estas circunstancias se compromete a someterse a las revisiones periódicas que el profesional considere oportunas durante e incluso después de concluir el tratamiento.

El paciente conoce que, después de terminar el tratamiento y dependiendo del caso concreto, es necesario utilizar algún sistema de contención para evitar modificaciones posteriores de la alineación dentaria. Esta fase de retención también precisa revisiones, aunque más espaciadas. Un tratamiento de ortodoncia no garantiza que los dientes estén perfectamente alineados toda la vida, pues a lo largo de los años los dientes están sometidos a fuerzas de masticación, habla, hábitos y al desgaste propio que sufre todo el organismo.

Observaciones	f exadencia	a de los	of codd	e S	
*	alion	(0)	14) ~ (35)		
×	retención	Ria 1/5	SIGGEST 8	up life	
*	necesaria	6 lebrace	ión con uso	de etention	7
anstercia	a citas	(Sono	to rede	alargare) 5/11/2024	O
		Lugar y fecha	1,20	, 5/11/2009	

El paciente (padre, madre o tutor en caso necesario)

El odonto-estomatólogo informante

36001766

El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Orense y Pontevedra, de acuerdo con la legislación vigente en España, obliga a sus colegiados a explicar este formulario a todos los pacientes que van a ser tratados de determinadas enfermedades.